

Faculté de Médecine de Paris

Année 1953.

485<sup>N</sup>

T H E S E

pour le

DOCTORAT EN MEDECINE

(Diplôme d'Etat)

par

BERGE, Claude

Né le 20 Juin 1926 à Casablanca (MAROC)

Présentée et soutenue publiquement le

PARODONTOPATHIES PRECOCES.

- oOo -

Président : M. DECHAUME, Professeur.

- oOo -



Faculté de Médecine de Paris

---

Année 1953.

---

N°

---

T H E S E

pour le

DOCTORAT EN MEDECINE

(Diplôme d'Etat)

par

BERGE, Claude

Né le 20 Juin 1926 à Casablanca (MAROC)

---

Présentée et soutenue publiquement le

---

PARODONTOPATHIES PRECOCES.

- oOo -

Président : M. DECHAUME, Professeur.

- oOo -

1921

1921

1921

(1921)

1921

1921

1921

1921



1921

1921

1921

1921

# DOYEN HONORAIRE :

M. BAUDOUIN

## PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. BAUDOUIN, BRINDEAU, CARNOT, CHEVASSU, CHIRAY, CLERC, DELBET, GOUGEROT (H.), GUILLAIN, HARVIER, LAIGNEL-LAVASTINE, LAUERY, LEMAITRE, LEMIERRE, LHERMITTE, LOEPER, MARION, MATHIEU, MOCQUOT, MULON, OMBREDANNE, ROUVIERE, SANNIE, SEBILEAU, SEZARY, TANON.

DOYEN : ..... Léon BINET,  
Membre de l'Institut.

ASSESEUR : ..... Jean VERNE.

## I. - PROFESSEURS

MM.

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Anatomie .....                                                   | CORDIER (G.)         |
| Anatomie pathologique .....                                      | DELARUE (A.)         |
| Bactériologie .....                                              | GASTINEL (P.)        |
| Biologie appliquée à l'Education physique et<br>aux Sports ..... | CHAILLEY-BERT (P.)   |
| Biologie médicale .....                                          | VERNE (J.)           |
| Cancérologie médicale et sociale .....                           | HUGUENIN (R.)        |
| Carcinologie .....                                               | OBERLING (C.)        |
| Chimie médicale .....                                            | POLONOVSKI (M.)      |
| (Hôtel-Dieu .....                                                | BROCQ (P.)           |
| Cliniques chirurgicales ..... (Saint-Antoine .....               | CADENAT (F.)         |
| (Salpêtrière .....                                               | MONDOR (H.)          |
| (Cochin .....                                                    | QUENU (J.)           |
| Clinique chirurgicale réparatrice et orthopédique                | MERLE D'AUBIGNÉ      |
| Clinique de cardiologie .....                                    | DONZELOT (B.)        |
| Clinique de chirurgie infantile et d'orthopédie.                 | FEVRE (M.)           |
| Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire .....                    | MONOD (R.)           |
| Clinique de la tuberculose .....                                 | BERNARD (E.)         |
| Clinique de neuro-chirurgie .....                                | PETIT-DUTAILLIS (I.) |
| Clinique de puériculture .....                                   | LELONG (M.)          |
| Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.                 | DEGOS (R.)           |
| Clinique des maladies du sang .....                              | CHEVALLIER (P.)      |
| Clinique des maladies du système nerveux .....                   | ALAJOUANINE (T.)     |
| Clinique des maladies des enfants .....                          | DEBRE (R.)           |
| Clinique des maladies infectieuses .....                         | MOLLARET (P.)        |
| Clinique des maladies mentales et de l'encéphale                 | DELAY (J.)           |
| Clinique gynécologique .....                                     | FUNCK-BRENTANO (I.)  |
| (Hôtel-Dieu .....                                                | BENARD (H.)          |
| Cliniques médicales ..... (Bichat .....                          | LAROCHE (G.)         |
| (Cochin .....                                                    | MOREAU (R.)          |
| (Pitié .....                                                     | LIAN (C.)            |
| Clinique médicale d'hydro-climatologie théra-<br>peutique .....  | JUSTIN-BESANÇON (L.) |



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

[https://archive.org/details/IA41552428\\_0048](https://archive.org/details/IA41552428_0048)





|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologie médicale .....         | ( BOURLIERE (F.)<br>ETTORI (J.)<br>Pr.s.ch.                                                                                                                                                      |
| Chimie médicale .....           | ( JAYLE (M.F.)<br>pr.s.ch.<br>SCHAPIRA (G.)<br>N...                                                                                                                                              |
| Dermato-Syphiligraphie .....    | ( BULLIARD (H.)<br>Pr.s.ch.                                                                                                                                                                      |
| Histologie .....                | ( COUJARD (R.)<br>DESCLAUX (P.)<br>DEBRAY (C.)                                                                                                                                                   |
| Hydrologie .....                | ( BOYER (J.)<br>DEPARIS (M.)                                                                                                                                                                     |
| Hygiène .....                   | ( DEROBERT (L.)<br>GAULTIER (J.)<br>N...                                                                                                                                                         |
| Médecine légale .....           | ( SEZE (S. de)<br>GRASSET (J.)<br>LEPAGE (F.)<br>MAYER (M.)                                                                                                                                      |
| Neurochirurgie .....            | ( MERGER (R.)<br>RAVINA (J.)<br>VARANGOT (J.)<br>OFFRET (G.)<br>DESVIGNES (P.)                                                                                                                   |
| Neurologie .....                | ( HALPHEN (E.)<br>pr.s.ch.<br>MADURO (R.)<br>BRUMPT (L.)<br>CHABAUD                                                                                                                              |
| Obstétrique .....               | ( ABOULKER (P.)<br>BAUMANN (J.)<br>GOSSET (J.)<br>HUGUIER (J.)<br>LAURENCE (G.)<br>LEGER (L.)<br>OLIVIER (Cl.)<br>PADOVANI (P.)<br>POILLEUX (M.)<br>ROUX (M.)<br>RUDLER (J.-C.)<br>VERNE (J.-M.) |
| Ophtalmologie .....             | ( MERKLEN (P.)<br>BERNARD (J.)<br>BOUDIN (G.)<br>GASTAIGNE (P.)<br>CONTE (M.)<br>DECOURT (J.)                                                                                                    |
| Oto-rhino-larygologie .....     |                                                                                                                                                                                                  |
| Parasitologie .....             |                                                                                                                                                                                                  |
| Parasitologie coloniale .....ff |                                                                                                                                                                                                  |
| Pathologie chirurgicale .....   |                                                                                                                                                                                                  |
| Pathologie expérimentale .....  |                                                                                                                                                                                                  |
| Pathologie médicale .....       |                                                                                                                                                                                                  |







|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
|                                | { BOULIN (R.)    |
|                                | { BROUET (G.)    |
|                                | { CACHERA (R.)   |
|                                | { GARGIN (J.)    |
| Clinique Médicale .....        | { HAGUENEAU (M.) |
|                                | { LENEGRE (J.)   |
|                                | { MARCHAL (G.)   |
|                                | { SOULIE (E.)    |
| Clinique obstétricale .....    | { DIGONNET (L.)  |
|                                | { EGALLE (G.)    |
| Clinique ophtalmologique ..... | RENARD (G.)      |
| Clinique urologique .....      | COUVELAIRE (R.)  |

---

Secrétaire de la Faculté : ..... MOREL (J.)  
 Secrétaire-adjoint : ..... Melle CHAINTREUIL (G.)

---

Bibliothécaire en Chef ..... Docteur HAHN (A.)

Bibliothécaires ..... { M. DOUAN (G.), Mlles DULAITRE (P.)  
 ..... { GOICHON (A.-M.), LE NOIR (G.)

---

Par délibération en date du 9 Décembre 1798, l'Ecole a  
 arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui  
 seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs  
 auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni  
 improbation.







Mon Maître et Président de Thèse

Monsieur le Professeur M. DECHAUME  
Professeur de Clinique de Stomatologie  
Stomatologiste des Hôpitaux de Paris  
Officier de la Légion d'Honneur.  
Médaille Militaire 1914-1918  
Croix de Guerre.

Qui nous a fait le  
grand honneur de présider notre



- A mon Maître

~~Monsieur~~ Le Professeur Agrégé A. CHAPUT  
Stomatologiste des Hôpitaux de Paris.

A qui je dois le ~~bonheur~~  
et qui a su me conseiller et me  
diriger avec tant de sollicitude

Avec toute ma ~~respectueuse~~  
profonde reconnaissance



- A mes Maîtres dans les Hôpitaux.

Monsieur le Professeur Agrégé CERNEA  
Stomatologiste des Hôpitaux de Paris

Monsieur le Docteur CAUHEPE  
Stomatologiste des Hôpitaux de Paris

Monsieur le Docteur CHATELLIER  
Stomatologiste des Hôpitaux de Paris

Madame le Docteur PAPILLON-LEAGE  
Stomatologiste des Hôpitaux de Paris

Monsieur le Docteur GORNOUEC  
Stomatologiste des Hôpitaux de Paris

Monsieur le Docteur RICHARD  
Stomatologiste des Hôpitaux de Paris

Monsieur le Docteur LACAISSE  
Stomatologiste des Hôpitaux de Paris

Monsieur le Docteur HENNION  
Stomatologiste des Hôpitaux de Paris

Monsieur le Docteur GRELLET  
Stomatologiste des Hôpitaux de Paris

Monsieur le Docteur LALBERT  
Stomatologiste des Hôpitaux de Paris

- A mes Maîtres de l'Institut de Stomatologie de la Faculté  
de Médecine de Paris.







L'anatomie comparée (LISON) montre que les deux seuls tissus dentaires qui existent dans toute la série des vertébrés sont la dentine et l'émail. La présence du cément est liée à un type spécial d'implantation de la dent "dans un alvéole" qui n'existe que chez quelques crocodiliens et chez les mammifères. Partout ailleurs l'implantation se fait à la surface du maxillaire généralement par ankylose, et beaucoup plus rarement par syndesmose ou gomphose (ORPHEE) c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un ligament fibreux et tous ces animaux chez qui il n'existe pas d'alvéole ni de cément. Le cément fait donc partie des éléments de soutien de la dent. LISON fait remarquer que l'implantation dans une alvéole est liée à un type spécial d'alimentation chez les vertébrés. Sauf chez les mammifères et quelques crocodiliens, la dent chez eux est en principe seulement un organe de préhension des aliments, alors que chez ces mammifères surtout, et quelques crocodiliens, la dent est un organe de mastication.

Quand la dent devient masticatrice, elle acquiert un nouveau type d'implantation dans un alvéole et en même temps le complexe cément, plus périodonte, plus os alvéolaire se développe.

Au point de vue embryologique, c'est du sac dentaire conjonctif qui enveloppe le bourgeon dentaire que dérivent le cément et le périodonte.

Au point de vue physiologique, le métabolisme des tissus dentaire et parodontaire diffère. Le métabolisme de la dent proprement dite est extrêmement ralenti lorsqu'elle a atteint sa période de maturation. Les seules modifications tissulaires de la dent sont sous la dépendance de la pulpe, des odontoblastes et de leur pouvoir de former de la dentine secondaire réactionnelle et de la sénescence de l'émail et de la dentine qui se traduit par une modification de leur perméabilité. A l'opposé, les tissus parodontaires sont extrêmement labiles; leur plasticité s'oppose à la relative fixité des tissus durs de la dent. Enfin, l'interrelation des tissus du parodonte entre eux, leur réaction au cours des troubles fonctionnels et pathologiques sont un argument de plus pour les réunir.

Nous désignerons donc par le terme de parodontopathie d'une part, les affections, maladies et processus tumoraux



qui frappent la fibromuqueuse gingivale seule; d'autre part, les maladies qui frappent le parodonte proprement dit, soit le cément, le ligament alvéolo dentaire (périodonte), l'os alvéolaire et le tissu gingival. Nous désignerons ces différentes lésions par les termes de gingivite et gingivose pour les premières et par parodontolyse, les dernières.

Dans ces parodontopathies, nous étudierons les maladies du parodonte chez les sujets âgés de moins de 25 ans. Nous ferons encore une distinction entre les enfants d'une part, les adolescents et les adultes jeunes jusqu'à 25 ans d'autre part.

Pour les enfants, nous ferons brièvement une étude nosologique et bibliographique. Quant aux adolescents et adultes jeunes, nous essaierons d'individualiser parmi 57 observations, quelques cas typiques.

Or, il est bien évident que c'est dans cette première partie de la vie que nous pourrons le mieux analyser les manifestations cliniques et les circonstances étiologiques des parodontopathies. C'est en effet sur des sujets ayant une denture complète et chez des individus qui ont des antécédents pathologiques simples que nous pourrons observer presque à l'état pur des facteurs locaux, généraux et constitutionnels qui contribuent au développement de ces parodontopathies.

Nous résumerons brièvement les descriptions de la littérature sur ce sujet, puis nous décrirons les parodontopathies précoces que nous avons pu observer. Enfin, nous essaierons d'en tirer les conclusions étiologiques, thérapeutiques et prophylactiques.



## CHAPITRE I

### HISTORIQUE.

Parmi les importants ouvrages consacrés aux maladies de parodontie, les formes précoces des parodontopathies n'ont pas fait l'objet de descriptions très détaillées.

FAUGHARD n'en fait pas mention.

H. ROY (1935) signale deux formes de parodontopathies précoces :

- la forme commune de parodontite inflammatoire qui peut être très précoce et donner un tableau clinique très grave à 10 ans; cette forme peut évoluer sous formes pathologiques, mais est souvent associée à la tuberculose pulmonaire.

- et la forme hyperhémique ou "atrophie juvénile" manifestant chez les sujets de 10 à 13 ans pour évoluer avant 18 ans, âge où la maladie se fixe. Cette forme évolue sans signes inflammatoires mais peut se transformer en parodontite inflammatoire. La carie cémentaire sera une des complications de cette forme atrophique.

A.J. HELD (1939) indique que les gingivites aiguës de l'enfance évoluent parallèlement à la parodontite chronique.











titres originelles surviennent à la suite d'une déficience du système général, en dont l'évolution est plus sévère et plus rapide que chez l'adulte, des gingivites hypertrophiques; chez les enfants, surtout chez les prépubères, des périodontoses ou atrophies alvéolaires, très rares sur la dentition temporaire.

- Dans la période pubertaire, l'auteur signale des gingivites généralisées, "des périodontites marginales" avec résorption importante de l'os alvéolaire, pouvant aller jusqu'à l'expulsion des dents; l'hyperplasie gingivale est plus fréquente après la puberté, ayant comme facteur certain un traumatisme occlusal; l'atrophie présénile ou atrophie sénile précoce, sévère, au niveau des dents maxillaires et des premières molaires en haut, sans signe inflammatoire, dont l'étiologie est à peu près inconnue, et dont le mode histopathologique est semblable à celle de l'atrophie sénile physiologique; enfin, des "périodontoses" apparaissant avec la puberté, dont l'étiologie est obscure, mais dans laquelle les facteurs constitutionnels jouent un grand rôle.

H. MERITT (1950) distingue : des gingivites marginales, hypertrophiques, hyperplasiques, atrophiques, et des gingivites avec desquamation chronique; et d'une part, de la pyorrhée alvéolaire ou "périodontite", dans laquelle l'os alvéolaire et la gencive sont détruits avec formation de fistules et des pyorrhéiques, et d'autre part, de la "périodontose", qu'il définit comme étant une atrophie diffuse de la "périodontite" (périodontite) avec déplacement des dents. Cette dernière ne s'observe pas pur que chez l'enfant et surtout chez les jeunes filles de 17 à 19 ans atteintes de diabète, néphrite, tuberculose, déficience de nutrition. Le pronostic de cette affection est grave.

CHILTON (1950) montre l'intérêt de l'examen radiographique précoce de l'os alvéolaire et de la "lamina dura" dans le diagnostic systématique des périodontites. L'auteur fait aussi l'opinion suivant laquelle c'est chez l'enfant que l'on peut établir le tableau clinique de ce que deviendra plus tard une "périodontolyse". L'auteur cite une statistique de BLACK (1918) selon laquelle sur 500 personnes âgées de 10 ans, 100 étaient atteintes de parodontite, elles entre 20 et 24 ans étaient atteintes de parodontite. L'auteur cite aussi GIESON (1941) qui donne la statistique suivante : 22 % de 11 à 20 ans et 37 % de 21 à 25 ans, le critère étant la résorption osseuse.



LEBOURG et DESCHONAILLES (1946) étudient une parodon-

M. DECHAULE, Mme A. CHAPUT et A.J. HEILD (1949) décri-  
SCHULLER CHRISTIAN.

B. SEIDNER et S.C. MILLER (1950) étudient 36 cas de destruction précoce de l'os alvéolaire et en tirent les conclusions suivantes :

- la maladie frappe plus de jeunes filles que de garçons seulement 8,6 %, mais est plus grave chez ces derniers;

- elle siège dans la région antérieure et au niveau des premières molaires.

- "L'alvéoclasie" est plus diffuse chez les garçons.

- Le maximum de gravité survient à 13 ans, âge de la puberté chez les jeunes filles, et un peu plus tard, chez les adolescents.

- Enfin, chez 80 % des malades dont le régime était trop riche en hydrates de carbone, la restriction de ceux-ci a apporté une nette amélioration.

JACOWSKI (1951) sur des sujets âgés de 19 à 23 ans, observe au Tonkin, des parodontoses inflammatoires coexistant avec un régime mal équilibré, des colites parasitaires avec leurs complications buccales, et l'habitude de chiquer le bétel.

J.L. SCALES (1952) remarque qu'au cours des stomatites les frontières des différentes sortes de muqueuse;

R. BATAILLE et B. DUPERRAT (1952) étudient les parodontolyses au cours de certains kératodermies palmo-plantaire.



Mme A. CHAPUT, P. UHRY et COLL (1952) à propos de l'observation de 63 diabètes juvéniles, décrivant les lésions du parodonte chez ces sujets.

WICKHAM (1952) étudie les lésions périodontales chez l'enfant. Il distingue :

- les gingivites localisées de cause locale,
- les gingivites généralisées d'étiologie générale,
- les parodontites superficielles des incisives et des premières molaires,
- et les parodontites profondes qui sont très rares.

SHAPIRA (1952) classe les signes de début des maladies du parodonte : mobilité des dents, douleur de la gencive, changement de forme de cette dernière, transformation de l'exsudat cervical (test au Guaiac), à l'expression issues de pus et de sang, enfin modification radiographique.

BOUYSSOU (1953) a observé une véritable pyorrhée alvéolaire des dents temporaires persistant à la suite d'un traitement par la thyroxine chez une jeune fille myosécutaneous de 17 ans, qui présentait par ailleurs une anhydrose absolue avec hypertrichose et oligodontie (19 dents permanentes) ainsi qu'une hérédité chargée : éthyisme, syphilis, hémophilie.

En dépit du grand nombre de ses références, le sujet n'a pas encore fait l'objet d'une revue d'ensemble basée sur un examen systématique.

Nous commencerons donc par l'étude des parodontopathies précoces chez les enfants, puis celle des parodontopathies chez les adolescents et les adultes jeunes avant 25 ans.







a) Gingivites de cause locale chez l'enfant.

Les gingivites de cause locale sont souvent prédominantes au voisinage d'un point d'irritation.

Les causes locales des gingivites chez l'enfant sont l'éruption dentaire, les dépôts de tartre, les caries non soignées, les troubles de l'occlusion, la respiration nasale.

- Accidents de dentition - Une gingivite localisée érythémateuse ou ulcéreuse accompagne parfois le retard de chute d'une molaire temporaire mortifiée plus ou moins vasculaire ou d'un débris radiculaire. Parfois, l'éruption d'une dent permanente entraîne une péri-coronarite. L'évolution de cette gingivite est subaiguë ou aigüe et s'accompagne le plus souvent d'un adénite dans le territoire ganglionnaire correspondant.

- Dépôts tartreux - Le tartre sus-ou sous-gingival, moins fréquemment observé que chez l'adulte, n'est cependant pas exceptionnel chez l'enfant bien portant. Ainsi, BRIDGMAN (1952) a pu établir une statistique sur les enfants de New-Foundland (Golf du St.-Laurent). Les résultats sont les suivants :

- à 5 ans, 1 enfant sur 100 ont un dépôt tartreux important
- à 14 ans, 20 enfants sur 100 " " " " "

- Caries - BRUCKER M. (1943) sur un groupe de 72 garçons et 47 filles présentant des gingivites légères trouva 2,5 à 3,5 caries par enfant et pour 12 garçons et 11 filles ayant des gingivites sévères, entre 4 à 5 caries par enfant. Pour RICHY G.B. (1953) l'antagonisme entre caries et maladies du parodonte n'est pas établi, et la gingivite de cause locale, prédominante, favorisée par des caries non traitées, est une variété clinique non négligeable. BRIDGMAN (1952) sur les mêmes enfants de New-Foundland trouve, à 5 ans, 30 % de caries et à 14 ans, 30 %

- Occlusions déséquilibrées. - La surcharge de certaines dents, les traumatismes fonctionnels, les malpositions dentaires, les mauvaises habitudes (suce du pouce, interposition de la langue) l'absence de fonction, sont également nocifs et déterminent fréquemment des gingivites localisées érythémateuses et quelquefois ulcéreuses.







1952) l'extraction, associée à la gingivectomie, empêche seule la récurrence. Ces récidives, qui, d'ailleurs ne sont que rémanentes après le traitement chirurgical économe, sont peut être dues à l'absence de correction d'un trouble endocrinien tel que l'hyperthyroïdie ou un trouble sanguin associé (L. DECHAUME) tel que anémie, leucose ou trouble sanguin frustre.

- Gingivite spécifique de l'enfant. - Le chancre gingival de primo-infection tuberculeuse représente la localisation infectieuse spécifique la plus importante. Décrit par DEBOS et DECHAUME (1941) il survient chez un enfant en période de dentition. Le chancre est constitué au niveau de la fibre-muqueuse gingivale par une ulcération en feuillure de livre dont le fond est muriforme, les bords décollés, laissant mourir un exsudat purulent. Il s'accompagne d'une adénite satellite volumineuse qui évolue vers la suppuration. Le diagnostic est confirmé par l'étude des réactions cutanées (cuti-réaction ou parcuti-réaction cutanée) et l'association de l'exsudat au cobaye. Rarement, en effet, on ne peut mettre en évidence, directement ou après culture sur les milieux spéciaux, la bacille de Koch. Le pronostic est sérieux en l'absence des signes de diffusion et des signes biologiques. Or, dans tous les cas, il faut craindre la dissémination miliaire et la méningite. Mais l'évolution bénigne est la règle lorsque la surveillance de l'enfant est minutieuse et le traitement bien conduit. Nous ne saurions trop insister sur la surveillance au cours de la primo-infection : courbe de poids et de température, radiographie périodique du thorax, sédimentation globulaire, tubage gastrique, fond d'oeil et ponction lombaire au moindre doute.

Le traitement de fond consistera en une cure hygiéno-diététique rigoureuse pendant trois mois s'il s'agit d'une primo-infection simple, et, lorsqu'il y aura des complications, jusqu'à cessation complète de ces dernières. L'aération est essentielle, ainsi qu'un régime alimentaire équilibré. Le traitement par les antibiotiques est très discuté car ceux-ci n'ont pour ainsi dire aucune action sur le ganglion tuberculisé, du fait que sa vascularisation est très diminuée. Cependant, les antibiotiques s'opposent à la dissémination de la maladie. La prophylaxie consistera en la recherche des contacts possibles et en la vaccination anti-tuberculeuse par le BCG.

- Hyperplasie gingivale médicamenteuse à l'éthérétoine. C'est la commune (KELLEY, FLETCHER, WILSON, HERNIM). Cette hyperplasie atteint 40 à 60 % des sujets traités par cet anticonvulsivant depuis 6 mois à 1 an. Ce sont surtout des jeunes



sujets qui en sont frappés.

L'hyperplasie siège au niveau des faces linguale, palatine et vestibulaire des bords gingivaux et prédomine au voisinage des causes d'irritation. Elle est de moyen volume, ferme, lobulée, non inflammatoire, ne s'accompagnant pas d'alvéolyse ni d'œdème, ulcération, hémorragie ou adénopathie. Le mécanisme de cette hyperplasie est obscur. L'avitaminose B invoquée par les premiers observateurs ne paraît pas devoir être reconnue. Des observations où la gingivite s'associe à des signes tels que dysarthrie, diplopie, ataxie, posent le problème de l'origine centrale de ces troubles.

S'agit-il par ailleurs d'un trouble endocrinien associé tel que l'hypothyroïdie, ou d'un trouble sanguin comme il a été signalé dans quelques observations ? Mais dans tous les cas, l'association de la révision de la denture, du brossage rigoureux, l'administration d'un extrait hépatique et un régime varié permet d'éviter la récurrence après la gingivectomie, malgré la continuation de traitement.

- Gingivite et diabète. - La gingivite est fréquente au cours du diabète du jeune.

Sur un groupe de 63 diabétiques jeunes, d'âge variant de 6 à 25 ans, d'une durée de maladie de quelques mois à 24 ans, UHRY et A. CHAPUT (1952) ont relevé 23 cas de gingivite dont 9 chez des enfants de 12 à 15 ans. La gingivite est marginale, congestive, hypertrophique avec déformation en biseau de la cloche. Elle s'accompagne souvent de gingivorragie. Elle crée un défaut de contact gingivo-dentaire sans altérer la fonctionnalité de l'articulation alvéolo-dentaire. Elle est rarement nécreuse; elle s'accompagne de tartre sus- et sous-gingival; la perlèche est fréquente ainsi que l'œdème du bord libre de la langue et de la face interne de la joue qui garde l'empreinte des dents.

La gingivite évolue par poussées qui s'associent souvent aux fluctuations de l'équilibre du diabète et aux périodes de régression. Elle s'accompagne quelquefois de signes de néphropathie diabétique, des poussées peuvent entraîner l'apparition d'ulcérations douloureuses, bien que rarement.

Dans d'autres cas, c'est à l'occasion d'une période de fatigue, de surmenage ou au moment des règles que ces







- Gingivite et malnutrition. - La malnutrition entraîne une fréquence élevée des gingivites chez l'enfant. 85 % des enfants des districts du Centre aux Indes, présentent des gingivites souvent hypertrophiques et, par contre, peu de caries. De même 94 % des enfants Maori, en Nouvelle Zélande ont des gingivites sans caries, pour MARSHALL DAY (1944).

SHOUR et MASSLER (1947) en Italie, après la guerre, chez des enfants hospitalisés, ont trouvé de 2 à 6 ans 50 %, de 7 à 9 ans 20 %, et, de 10 à 14 ans, 48 % de gingivites, ce qui fait, sur un total de 221 enfants hospitalisés âgés de 2 à 14 ans, 40,2 % de sujets présentant des gingivites.

Ces gingivites évoluaient d'une façon cyclique et récurrente en trois stades. Un stade ordinaire avec inflammation avec perte du tonus gingival et apparition de débris alimentaires et de plastrons. Un stade aigu où les gencives sont épaissies, rouges et où des cuils-de-sac apparaissent puis surviennent des hémorragies spontanées enfin, apparition de plaques et débris nécrotiques. Enfin, un stade de guérison : les débris disparaissent, les gencives sont dures et fibreuses et les dents sont dénudées. Cette gingivite débute sur les gencives antérieures en regard des dents temporaires, pour s'étendre par la suite à la région postérieure. Les incisives et la papille antérieure sont le plus sévèrement touchées. La maladie est moins sévère sur les dents permanentes. La maladie peut récidiver après le 1er cycle et se poursuivre en évoluant en 3 ou 4 cycles jusqu'à la dénudation complète des dents.

Le traitement est très décevant. Cependant, la "niacinamide" et la "pyriodoxine" semblent guérir les lésions en deux à trois semaines.

Dans certaines régions pauvres, l'incidence de la carie et des gingivites sont parallèles, 90 % des enfants de 6 ans et 19 % des enfants de 14 ans du New-Fondland au Canada ont des gingivites associées à des oléphasies. Les pyriodoxine, les modifications de la langue, des mêmes enfants ont 10 % de caries temporaires et 2 % de caries permanentes caries (J. MARSHALL 1947).

La plupart des auteurs pensent que les facteurs qui déterminent la carie et les gingivites sont absolument indépendants et que ces deux affections évoluent indépendamment l'une de l'autre (J. MARSHALL 1947). Mais les caries des enfants hospitalisés les gingivites même chez l'adulte sont plus liées.















grand nombre d'observations du travail de MEYER (1952). Il s'agit d'enfants jeunes, et la parodontite est souvent associée à une ostéite tuberculeuse centrale de la branche montante ou de la branche horizontale du maxillaire inférieur. Le plus, la tuberculose osseuse est à foyers multiples. R. STONE (1961) en décrit un cas au niveau de la région incisive mandibulaire chez un enfant noir de 6 ans qui présentait par ailleurs d'autres foyers osseux. L'infection osseuse est fait par voie sanguine.

- Au cours de l'ostéomyélite d'origine sanguine, l'atteinte des parodontes est toujours secondaire. La séquestration prédomine au niveau du corps de l'os, aussi bien au cours de l'ostéomyélite du maxillaire supérieur de l'enfance que de l'ostéomyélite aiguë des adolescents, qui siège le plus souvent à la mandibule. Cependant la perte des dents et des germes est loin d'être exceptionnelle.

#### 4°) Parodontite endocrinienne de l'enfant.

a - Parodontite et diabète du jeune. - La parodontite de l'enfant diabétique est rare. Sur un groupe de 63 sujets, Mme A. CHAPUT (1952) l'a observée 3 fois sur des sujets de 9 ans, 11 ans et 14 ans. La parodontite succède à la gingivite. Elle peut apparaître au début de l'évolution mais est habituellement tardive. Elle est le plus souvent généralisée, prédominant dans la région incisive, et est rapidement mutilante. Les gencives ont un aspect congestif, parfois violacé, présentent des zones hyperplasiques, polypoides, qui dénudent les collets des dents, encroûtées de tartre brun-jaunâtre. Le retrait de la gencive est moins important que la résorption de l'os alvéolaire, ce qui a pour conséquence la formation de culs-de-sac avec perte de l'herméticité de l'articulation alvéolo-dentaire. Ces culs-de-sac sont souvent profonds et purulents. Les parulis sont fréquentes, les dents du voisinage sont plus ou moins mobiles surtout dans le sens axial (signe de BELLARD). Lorsque la destruction parodontaire est très avancée, les dents peuvent se déplacer dans le sens axial et latéral.

Les examens radiologiques mettent en évidence le retrait alvéolaire dans le plan horizontal et permettent d'apprécier l'intensité des résorptions verticales qui prédominent dans les régions incisives et prémolaires supérieures. Le plancher du sinus peut même disparaître. Le maximum des lésions siège surtout au niveau des dents infestées et sur celles qui sont surchargées soit dans l'occlusion centrique, soit dans les











L'atteinte profonde du parodonte est un signe classique de scorbut chez l'enfant, et maladie de l'adulte. On observe d'abord, dans l'enfant ainsi que dans l'adulte, une gingivite fruste avec purpûres, œdème, hémorragies avant l'éruption dentaire. Puis après l'éruption des dents, surtout au niveau des incisives, canines, molaires, la gencive est rouge, violacée, hyperplasiée, tuméfiée; elle peut s'ulcérer et saigner. Enfin, il se produit une destruction ulcéro-nécrotique et une résorption alvéolaire entraînant la chute des dents. Ces faits ont été vérifiés expérimentalement chez l'animal.

Pour MELLANBY, les anomalies de l'émail, de la dentine et même la "pyorrhée alvéolaire", peuvent être sous la dépendance d'une carence en vitamine A.

e - Parodontolyse et réticulose. - Maladie de LETTERER-SIWE. - Cette affection maligne, rapidement mortelle, rangée dans le cadre des réticuloses endothéliales malignes, atteint les enfants très jeunes.

DEBRE, GORNOUNG, LALBERT, BUHOT, VIGNEUL, CAENEL - (1953) - en rapportent deux belles observations. Il s'agit d'un enfant de 7 mois et d'un autre de 9 mois. Cette maladie se manifeste, au point de vue buccal, par des ulcérations se développant insidieusement, généralement au maxillaire supérieur, sur la crête alvéolaire et sur la voûte palatine. Ces ulcérations sont superficielles, atones, à contours irréguliers, à bords nets surélevés; elles sont recouvertes d'un enduit sphacélique grisâtre ne saignant pas.

La radiographie montre une destruction, plus ou moins étendue, mais limitée à l'os alvéolaire. Les dents dont l'éruption est précoce et qui sont cernées par ces ulcérations se dénudent, deviennent rapidement mobiles, et s'expulsent spontanément.

Dans ce cadre de réticulo-endothéliose, nous étudierons des affections telles que les maladies de HAND-SCHULLER CHRISTIAN et la granulose hystiocyto-éosinophile.

Au cours de la maladie de HAND-SCHULLER CHRISTIAN, on observe des lésions de destruction des maxillaires dans 30 % des cas. (DANKSYS (1939)).











## CHAPITRE III

### PARODONTOPATHIES DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES ADULTES

Nous envisagerons d'abord les gingivites chez les sujets avant 25 ans, puis nous traiterons d'individuellement certains types de parodontolyse chez ces mêmes sujets.

### GINGIVITES DES ADOLESCENTS, DES ADULTES JEUNES

Nous ne développerons pas ce chapitre ayant trait aux lésions gingivales seules ne s'accompagnant pas d'alvéolites. Il se superpose à celui de l'enfant tant au point de vue de l'étiologie locale et générale que du point de vue clinique et anamnésique. En outre, nous insistons sur la grande fréquence des gingivites à cet âge, ce qui a fait décrire par certains auteurs des formes soit-dites épidémiques. Toutefois, les gingivites présentent une évolution très lente et passent à la chronicité, elles peuvent parfois être le premier stade d'une parodontolyse. C'est ce fait qui fait l'importance extrême de ce chapitre pour la prophylaxie des parodontolyses.

Nous essaierons de décrire maintenant cette gingivite chronique qui très souvent marque la période prodromique d'une parodontolyse ayant même que cette dernière une origine diagnostiquée radiologiquement.



PREY a bien décrit cette gingivite. Nous décrirons d'une part, les signes fonctionnels, d'autre part, les signes objectifs et physiques qui les uns comme les autres sont intermittents et peuvent apparaître soit à l'occasion d'une déficiences de l'état général, fatigue, grippe, menstruation, surmenage, excès alimentaires, soit cycliquement, par exemple au cours des changements de saison. Nous décrirons d'abord les signes subjectifs.

a - Signes subjectifs. - Le malade éprouve une sensation d'agacement gingival, de prurit gingival (BADER) tantôt localisé à un groupe dentaire, tantôt généralisé aux deux arcades. Dans d'autres cas, le malade, en se réveillant, perçoit au niveau de ses gencives et de ses dents une impression d'énervement qu'il soulage en crispant les mâchoires, ce qui a souvent pour effet de produire un léger ébranlement qui n'est d'ailleurs que provisoire. Parfois, c'est au cours du sommeil que se produit ce phénomène constituant alors la bruxomanie nocturne dont l'effet de Karolyi est la conséquence.

b - Signes objectifs. - En même temps que ces signes subjectifs, la gencive devient le plus souvent brusquement hyperhémie et hypertrophiée. Il se produit un bourrelet gingival marginal rouge foncé, violacé, ressortant par sa couleur nettement sur le fond rose du reste de la muqueuse gingivale. Les languettes interdentaires deviennent turgescents, en battant de cloche. La surface est oedématisée, mammelonnée, chaude. La pression digitale la fait pâlir rapidement, et après cessation elle reprend immédiatement sa couleur rouge foncé. Ce contact détermine aussi une gingivorragie importante, de même que la succion et le brossage des dents. Cependant, parfois cette gingivorragie est spontanée sans aucune cause apparente. L'examen local à ce moment initial ne permet pas de déceler la présence de décollement de la gencive au niveau des dents. Il faut par contre se méfier de la fausse apparence de décollement que donne la simple turgescence du bourrelet gingival surtout sur les faces linguales des gencives. On peut constater parfois une sérosité légèrement colorée entre la gencive et la dent. Le malade exécute des mouvements de succion pour obtenir la sensation de soulagement que lui donnera la décongestion temporaire de ses gencives. Son haleine est habituellement désagréable et il se plaint d'un mauvais goût dans la bouche.

L'évolution de cette gingivite dure quelques jours à quelques semaines, puis tout rentre dans l'ordre en apparence seulement, car il persiste une gingivite interstitielle et même marginale légère sertissant les dents, ou, apparition, s'il



n'existe pas encore, d'un dépôt de tartre jaune clair au début qui deviendra bientôt brunâtre ou verdâtre. Cette gingivite peut évoluer aussi par poussées successives pendant plusieurs années, sans que la radiographie ne puisse détecter aucune lésion de l'os alvéolaire.

Nous étudierons maintenant les parodontolyses chez les adolescents et les adultes jeunes avant 25 ans,

## 2 - PARODONTOLYSES

Nous avons étudié et suivi avec Mme A. CHAPUT 57 sujets ayant moins de 25 ans et présentant des parodontolyses. Cette étude va nous permettre de schématiser et d'individualiser des aspects cliniques, des facteurs locaux, généraux et constitutionnels de la maladie à cet âge.

### a) Aspect clinique des parodontolyses avant 25 ans.

Toutes les formes de parodontites et de parodontoses peuvent être observées chez les adolescents et les adultes jeunes avant 25 ans, comme l'a déjà signalé ZAPPIER.

Nous étudierons simultanément chez les sujets avant 25 ans les parodontites généralisées et localisées, et les parodontoses généralisées et localisées.

#### 1 - Parodontites généralisées de l'adolescent et de l'adulte jeune.

Elles peuvent être superficielles ou profondes et surviennent toujours chez des sujets présentant un trouble général.

- Parodontites superficielles. - Cette forme est la plus souvent une forme de début. Cette parodontite, avec ses douleurs, son prurit, agacement gingival, s'accompagne de gingivorragie spontanée ou provoquée par le brossage ou la succion. Elles ne s'accompagnent pas de formation de culs-de-sac ni de perte de l'herméticité de l'articulation alvéolo-dentaire. La suppuration est moins abondante. Un groupe de dents est souvent mobile.



L'évolution se traduit par poussées successives de gingivo-stomatite avec exacerbation de tous les signes locaux et fonctionnels. Ces poussées surviennent à l'occasion d'un relâchement de l'état général.

Les signes sont généralisés et prédominent au niveau des groupes dentaires dont l'équilibre occluso-articulaire est défavorable, ce qui concerne le plus souvent les régions incisive et molaire. Cette forme réagit brutalement avec un excès local, général et à une hygiène buccale corréctée. Cependant, elles peuvent se transformer en parodontite généralisée et profonde.

- Parodontites profondes. - Elles sont surtout caractérisées par une résorption osseuse plus importante en certaines régions que la rétraction gingivale, ce qui a pour effet la transformation de la gingivite profonde et suppurée. Cette forme se traduit donc uniquement par des signes fonctionnels gingivaux et dentaires marqués.

- Signes fonctionnels. - Les douleurs sont constantes, sont douloureuses spontanées, vives, irradiées, traduisant une tolérance à l'air, soit douleurs localisées exacerbées par la mastication due à l'inflammation du ligament alvéo-dentaire (parodontite). Dans d'autres cas, on note une sensibilité particulière aux liquides froids ou chauds, à l'air, au brossage, douleurs dues à la dénudation importante des collets et du collet des dents. Dans d'autres cas, enfin, ce sont des douleurs diffuses peu intenses, provoquées par une poussée de gingivite. Les gingivites spontanées ou provoquées sont aussi constantes. Enfin, la mobilité de certains dents ou groupes dentaires peuvent gêner la mastication.

A l'examen on note une gingivo-stomatite importante, la bordure gingivale recouvrant les dents a un aspect congestif et est plus ou moins ulcérée, hypertrophique. Les languettes interdentaires sont déformées; elles peuvent être rétractées, décollées, tuméfiées, ce qui donne un bouleversement du dessin régulier de la bordure gingivale. Le collet des dents est plus ou moins dénudé du côté vestibulaire pour toutes les dents et du côté palatin pour les molaires supérieures. Le collet de certaines dents apparaît et le tartre y est toujours abondant.

Les dents sont plus ou moins mobiles du fait de la destruction profonde des éléments de soutien parodontal. Cette



mobile peut être dans le sang, un os, et dans le sang, et dans le sang de l'os. En plus de cette mobilité, les dents peuvent se déplacer, agression vestibulo-occlusaire, et dans position, ce qui a pour conséquence l'apparition de diastèmes.

Enfin, dans cette forme, les culs-de-sac sont constants et sont découverts au cours de l'exploration systématique des sillons gingivo-dentaires. L'instrument explorateur est enfoncé verticalement entre le cément radiculaire de la dent décollée et la fibromuqueuse gingivale décollée. La muqueuse n'est que partiellement décollée et ce décollement ne fait jamais tout le tour de la dent ou dans ce cas, il est peu profond. Le cul-de-sac est donc limité par la partie du cément radiculaire, la face profonde de la fibromuqueuse gingivale, son bord est tapissé par "l'attachement épithélial" qui a émigré vers l'apex, enfin ses bords, par ce qui demeure des faisceaux ligamenteux fixant normalement le cément à l'os alvéolaire. Ces culs-de-sac sont plus ou moins profonds, pouvant atteindre dans certains cas l'apex des dents. Ils siègent d'habitude sur une ou deux faces des dents, proximo-vestibulaire sur les incisives, et proximales sur les molaires le plus souvent. Le cul-de-sac est toujours inflammatoire, et est le siège d'un exsudat purulent ou d'une suppuration plus ou moins abondante qui traduit alors une atteinte ostéitique du corps alvéolaire, libérant une odeur caractéristique.

Dans d'autres cas, il peut se former une fistule gingivale, une parulis ou abcès intra-gingival, un abcès parodontal (ROY) une cellulite circonscrite ou diffuse, une ostéite localisée ou diffuse, et des complications à distance.

Un dépôt de tartre se produit sur le cément en regard de l'en cal-de-sac, mais ne descend jamais aussi bas que la fourche de ce dernier.

Les lésions les plus importantes et les résorptions verticales siègent le plus souvent dans les régions incisives et molaires, et sont déterminées localement par la malocclusion et position centrique et plus souvent encore en position centrée. Le pronostic est d'autant plus mauvais que le début est plus précoce, que l'occlusion est déséquilibrée, et le trouble général irréductible.






vous l'avez montrée sans que je n'aie pu la voir.  
Je l'ai vu à l'Exposition de 1889.



Chlorophyllum

Chlorophyllum





11-10-11  
 11-10-11









## Chapitre II

### Paradoxe de la langue.

La langue est un instrument de communication. Elle est un moyen de communication. Elle est un moyen de communication. Elle est un moyen de communication.

### La langue est un instrument de communication.

La langue est un instrument de communication. Elle est un moyen de communication. Elle est un moyen de communication. Elle est un moyen de communication.

La langue est un instrument de communication. Elle est un moyen de communication. Elle est un moyen de communication. Elle est un moyen de communication.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

TO THE DIRECTOR, UNIVERSITY OF CHICAGO  
FROM THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
DATE: 10/1/68

SUBJECT: [Illegible]



10/1/68

[Illegible text]





Figure 1. Dental model showing the teeth in occlusion.



#### 4 - Les formes cliniques de l'adulte jeune.

Cette forme clinique se rapproche de la forme décrite plus haut, sans inflammation ni suppuration, mais l'affection siège au niveau d'une dent ou d'un petit groupe dentaire. Les parodontites se développent au jeune âge, surtout vers l'âge de 20 à 25 ans. Elles se traduisent par la dénudation vestibulaire du collet de quelques dents sans mobilité. Nous l'avons observé dans 2 cas, chez un homme et une femme.

On peut ranger dans ce chapitre "la forme déformante" de RCH qui est une forme particulière localisée de la région incisive, sans mobilité ni culs-de-sac.

Cependant, entre ces deux grands types cliniques, parodontites localisées ou généralisées et parodontites généralisées ou localisées, nous les observons existant de nombreuses formes mixtes qui sont très fréquentes.

#### 5 - Les facteurs locaux des parodontites avant 25 ans

Les facteurs locaux sont dominés chez l'adolescent et l'adulte jeune avant 25 ans par l'évolution de la dent de sagesse et par les troubles de l'occlusion, et singulièrement par la supra-clusion.

- L'évolution de la dent de sagesse est capable de générer au niveau du collet une inflammation, et peut-être génératrice d'accidents régressifs du parodonte. Ce fait est d'autant plus remarquable lorsque les dents de sagesse font leur éruption simultanément. Cela expliquerait que l'on constate le plus souvent le maximum de lésions dans la région incisive, c'est-à-dire au sommet de l'arcade.

FRANKL l'a observé maintes fois, et nous avons pu, avec Mme CHARUT, le constater dans 9 cas à propos de dents de sagesse éruptives au début de l'adolescence. Nous avons observé une parodontite localisée (obs. n° 41) ce qui fait une fois sur 5 sujets avant 25 ans.

- Les troubles de l'occlusion sont les causes favorables et les plus fréquentes pour expliquer les parodontites localisées et généralisées. Elles sont d'autant plus fréquentes qu'il y a un surplomb. D'une façon générale, tous les troubles de



l'occlusion dentaire normale et favorisée à l'appui des facteurs locaux.

Souvent, cependant, on se trouve devant des dentures qui semblent parfaites mais qu'un examen plus approfondi et minutieux révèle défectueuses. Ce sont, en général, des dents bien calcifiées, réfractaires à la carie, ayant des cuspidés très prononcées, entraînant en position centrique un engrènement cuspidien très marqué. On constate alors des surfaces de contact très grandes entre les dents antagonistes dans cette occlusion centrique. Mais dans le mouvement excentrique de latéro-pro- ou rétropulsion, seules quelques cuspidés se rejoignent, et les plans de glissement qu'empruntent ces cuspidés pour atteindre ces différentes positions sont, dans la plupart des cas, irréguliers et même cahotiques.

On comprendra donc facilement la difficulté de reconnaître dans les cas limites les petits troubles de l'occlusion dentaire et les petites lésions locales des parodontolyses.

Nous avons pu relever dans 57 observations 32 cas qui présentaient des malocclusions avérées ou des malpositions dentaires, dont 19 étaient des supraclusions. Nous citerons encore comme facteurs locaux :

- Des causes inflammatoires telles que les gingivites purpuriformes latentes, qui favorisent et aggravent les parodontolyses et les aggravent toujours.

HELD et NALLY ont prouvé l'existence d'une "infiltration gingivale lympho-plasmocytaire physiologique" qui est capable de devenir pathologique lorsque d'autres causes locales sont associées.

On peut donc ici citer toute la série des infections bucco-dentaires, gingivales, dentaires et apicales.

- De la terre et les calculs dentaires ont non seulement une action mécanique contre la denture, mais sont aussi source d'infection. C'est ainsi que nous avons relevé des dépôts tartreux très importants chez 11 sujets sur 57 examinés, soit près de 60 %.

- Les caries et les reconstitutions débordantes ou mal faites.



- 4 -

Nous signalerons encore ce que les auteurs anglo-saxons ont baptisé le "Food Impaction" c'est-à-dire la stagnation des débris alimentaires dans les espaces interdentaires à la faveur des diastèmes ou points de contact défectueux. Ces derniers auteurs font jouer à ce "Food Impaction" un rôle très important.

- Le surcharge fonctionnelle, ou surcharge fonctionnelle du parodonte. Récemment, les plus importants STILLMAN définit la surcharge fonctionnelle comme un contact défavorable entre les dents des deux mâchoires, que ce soit une occlusion centrique ou lors des mouvements manducatoires. Nous avons pu relever 9 cas de surcharge occlusale très nette.

Nous décrirons dans le cadre des facteurs locaux les causes parodontiques. En effet, le parodonte, du point de vue anatomique est en mesure de favoriser l'éclosion de parodontolyse. La gencive, en raison de la présence d'éléments lymphoïdes est considérée comme un émonctoire (VINCENT RETTERER). L'os alvéolaire est particulièrement fragile (HELD) et est un des premiers à subir les altérations générales des os; enfin l'élasticité du ligament alvéolaire est fonction de son étanchéité et des phénomènes vaso-moteurs qui règlent sa turgescence. Toutes ces causes contribuent donc à faire du parodonte, dont la fonction est de maintenir les dents, un appareil par lui-même en équilibre très fragile.

- Enfin, le brossage horizontal trop énergique avec la brosse en nylon, ainsi que l'abus des boissons acides, pourraient jouer un rôle dans les parodontiques localisées carcérales qui représentent peut-être le stade initial des lésions uniformes du collet (mylolyse).

Les facteurs locaux que nous venons de passer en revue déterminent l'aspect de l'alvéolyse mais ne sont pas la cause première de la parodontolyse, qui est toujours d'ordre fonctionnel et générale. Les formes traumatiques individualisées par certains auteurs (ORBAN) ne nous paraissent pas justifiées.

Facteurs généraux et constitutionnels des parodontites avant 25 ans.

Nous envisagerons d'abord les facteurs constitutionnels.



## 1 - Facteurs constitutionnels.

Dans une belle étude, ROUGET affirme que "aucun type constitutionnel n'est exempt de parodontolyse, et que toutes formes de parodontolyse se retrouvent dans tous les types. - Le type le plus souvent atteint est le type le plus susceptible. - Le parodontolyse atteint l'ensemble de l'arcade alvéolaire. Le parodontolyse profond se rencontre le plus souvent chez le type biléon, surtout masculin. - Les parodontolyse ont à l'origine une constitutionnelle variable et une localisation plus ou moins profonde existant à côté de parodontolyse et d'inflammation déterminante est locale et générale."

- Le facteur racial semble agir comme un facteur prédisposant. C'est ainsi que l'on a pu noter une prédisposition particulière aux parodontolyse chez des individus de race juive, les arabes, les nègres, les indiens du bassin américain et Méditerranéen et les Maures. Nous avons vu à la fois des observations, recueillies dans 2 cas, des individus de race méditerranéenne. Nous avons pu noter la présence de parodontolyse à l'apex de l'arcade alvéolaire (apex, apex ou apex), que nous avons noté dans 23 cas.

Certains auteurs ont voulu établir une relation entre le type morphologique et les parodontolyse. HEINRICH (1911). De même que HEINRICH, les parodontolyse sont les plus fréquentes chez les individus atteints de la forme biléon. D'autres auteurs ont étudié les individus atteints de la forme biléon et les individus atteints de la forme biléon. Cependant, aucun auteur n'a pu apporter de conclusion définitive dans les relations entre le type constitutionnel et la forme de parodontolyse.

Cela ne paraît d'ailleurs pas nous surprendre puisque c'est presque impossible de saisir le type pur, car toujours et plus ou moins, il est modifié par le milieu (ROUGET). C'est donc à l'étude des facteurs du milieu qu'il faut s'attacher, car le facteur héréditaire pur est encore plein d'inconnues.

C'est ainsi que tous les auteurs sont d'accord sur ce sujet et concluent que la vie sédentaire, les mauvaises habitudes, l'hygiène défectueuse, l'alimentation déséquilibrée, les mauvaises conditions de l'organisme et une moindre résistance au milieu. De même, la classe sociale aurait une incidence sur les parodontolyse et d'après HEINRICH, les classes moyennes et les intellectuels seraient plus susceptibles que les ouvriers, malgré l'hygiène défectueuse.











donc seulement en présence d'un dysfonctionnement endocrinien que l'on se trouve le plus fréquemment, surtout le diabète. Mais là encore, nous ne pourrions isoler un syndrome endocrinien, qui fera se développer chez un individu une parodontolyse.

Nous avons pu observer, dans 16 cas qui présentent des troubles endocriniens, 12 parodontites et 4 parodontoses. Parmi ces troubles endocriniens, nous avons relevé 4 parodontoses et une seule parodontite. Deux diabétiques avaient des parodontites, 2 autres des parodontoses. Enfin, chez 5 thyroïdiens, 4 parodontites et 1 parodontose. Nous avons relevé 4 parodontoses chez 2 hommes présentant des orchites.

Tous ces faits viennent confirmer les travaux de A.J. HELD (1939) R. VINCENT (1946) et H. SIEGMUND (1949).



## CHAPITRE IV

### OBSERVATIONS CLINIQUES

---

Observations de type A. CHAUT. Dont une grande partie a été recueillie à la chaire de clinique de Stomatologie du Professeur DECHAUME, à l'Hôpital de la Pitié.

---

Nous ferons une classification de ces observations en tenant compte du diagnostic que nous avons porté, soit parodontite localisée et généralisée chez l'homme et la femme et parodontose généralisée et localisée.

#### A - PARODONTITE GÉNÉRALISÉE

a) chez l'homme,

##### Observation n° 1

Monsieur Gilbert H..., né le 28 Juin 1901, vu à 48 ans le 9 Février 1949, début à 19 ans.

- Facteur racial : Basque.
- Antécédents : pneumonie, alcoolisme, signes hépatiques, alimentation carnée.
- Denture : caries, abrasions, déviation molaire, bilatérale, surcharge incisivo-canine.



- Radiographie : os dense, corticale, nette, résorption alvéolaire horizontale généralisée.

#### Observation n° 6.

Monsieur Jean-Louis E..., né le 29 Avril 1933 - vu à 20 ans le 10 Février 1953 - début à 19 ans.

- Antécédents : constipation, signes hépatiques, albumine 0, sucre 0.
- Denture : tartre, accident de la dent de sagesse d8, occlusion normale, mobilité de la région incisivo-canine.
- Radiographie : résorption horizontale généralisée, limite floue, os poreux.
- Traitement : détartrage, A.C.T.H., extraction 4<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> en désinfection, Oxyasène sans résultat - leucopénie 1.000 - amputation par auto-vaccin (antérocoques), surveillance régulière et détartrage. Régime alimentaire (régime hépatique).
- Pronostic : assez bon.

#### Observation n° 7.

Monsieur Claude L..., né le 28 Septembre 1924 - vu à la consultation le 15 Octobre 1952 à 28 ans - début à 25 ans.

- Antécédents : tumeurs maxillo-mandibulaires à récidive, signes hépatiques, hémorroïdes.
- Denture : tartre, occlusion normale, mobilité des dents, de prémolaires à prémolaires aux deux maxillaires.
- Radiographie : résorption horizontale généralisée, un poreux.
- Traitement : revu une seule fois pour détartrage.
- Pronostic : médiocre.

#### Observation n° 19.

Monsieur Michel L..., né le 6 Février 1927 - vu 22 ans le 30 Avril 1949 - début à 21 ans.

- Antécédents : hémorragie, gastrite, alimentation mixte, urticaire à 7 ans.
- Denture : tartre, accidents de dents de sagesse 4<sup>e</sup> - 4<sup>e</sup> traumatisme occlusal.



ographie : atrophie horizontale et généralisée à l'incisive nette.

Monsieur Raymond G..., né le 4 Octobre 1927 - vu à 22 ans le 3 Novembre 1949 - début à 20 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : épilepsie - tétanos, alimentation carnée - intoxication à ecclési - albumine après mastoïdite - frigidité, avortement, crises hystériques.
- Denture : maxillaire, gingivorragie, suppuration, écorchement dentaire, hyperplasie, articulé en boursin, en prothèse obtusale articulée sur 17, sur bords articulaire sur 13 12 D - 12 12 G, malposition dentaires.
- Radiographie : os dense, atrophie horizontale généralisée à bord net.
- Traitement : moulage des incisives.

Monsieur Maurice G..., né le 12 Avril 1903 - vu à 47 ans le 4 Janvier 1950 - début à 15 ans.

- Facteur familial : mère : alcool, bruxomanie et grincements de dents.
- Denture : gencives pâles, légèrement hyperplasiques, articulé sur 17 17 D - 17 17 G, en prothèse sur charge sur 11 11 et 12 12 G, mobilité des incisives inférieures avec mis-de-sau apparente.
- Radiographie : os poreux, atrophie horizontale généralisée, atrophie verticale sur 16, 11.

Monsieur Robert G..., né le 2 Septembre 1923 - vu à 29 ans le 21 Janvier 1949 - début à 21 ans.

Facteur racial : Algérien-Israélite.



- Antécédents : broncho-pneumonie à 2 ans, tabac, crispation crico-pharyngée en 1947, hernie inguinale.
- Denture : gingivite à 11 ans, accidents de dent de sagesse g8 - d8.
- Radiographie : os poreux, atrophie horizontale généralisée.

Observation n° 29.

Monsieur Jean D..., né le 22 Juillet 1922 vu à 23 ans le 27 Février 1950 - début à 23 ans.

- Antécédents : appendicite aiguë il y a deux ans, alimentation par conserves durant la guerre, douleurs articulaires avec contractions douloureuses des masséters.
- Denture : tartre et pus sur D1 G1 g1 - gingivite chronique avec ulcères - sensation normale - mobilité de D1 G1 et culs-de-sac et suppuration.
- Radiographie : atrophie horizontale généralisée, réaction verticale sur D1 G1, rhizolyse de D4.

Observation n° 30.

Monsieur Marcel T..., né en 1923, vu à 23 ans le 9 Novembre 1947, début à 20 ans.

- Antécédents : bacillose, cavitaire stabilisée, mains froides pâles, sympathicotonique.
- Denture : tartre, pus, gingivite antérieure et gingivorrhagie, mobilité des dents, supraclusion légère en 2 temps, clapiers purulents.
- Radiographie : résorption horizontale généralisée.
- Traitement : hygiène bucco-dentaire avec résultat puis 2012 donnant une légère amélioration.

Observation n° 49.

Monsieur René P..., né le 14 Juin 1931 - vu à 20 ans le 28 Mai 1952 - début 20 ans.

- Antécédents : coïte spasmodique, intoxication alimentaire, cyanose des mains.
- Denture : tartre, abrasion, hypoplasie sur D1 D2 d1 d2 d3 d4 d5 d2 d1 g1 g2 g3 g6; Accident de dent de sagesse sur g supraclusion, parodontolyse radiculaire congestive médiane, supérieure et inférieure sans suppuration.



Mademoiselle Jeanne L..., née le 11 Juillet 1930  
ans le 17 Mai 1950 - début à 13 ans. (Photo - p. 32)

- Facteur racial : Bretonne.
- Facteur familial :
- Antécédents : oreillons, constipation, cycle menstruel court  
21 jours, biopsie de l'endomètre normale, frottis  
vaginaux normaux, mycoplasmes, etc.
- Denture : caries, accidents de dent de sagesse d8, sur  
D4 G3 G4, mobilisation dentaire avec culs-de-s  
purants.
- Radiographie : os poreux, corticale floue, résorption hori  
tale généralisée, floue.
- Traitement : détartrage, moulage fonctionnel, dilvasène,  
contention obtenue par des plaques  
acrylique.
- Pronostic : médiocre.

Madame Louise D..., née le 27 Août 1907, vue à 43 a  
e 20 - janvier 1950, début à 21/ans.

- Facteur racial : Massif Central.
- Facteur familial :
- Antécédents : sinusite, hirsutisme.
- Denture : caries, occlusions normales, clapiers suppurants  
radiographie - résorption horizontale, os  
noir. Limite floue.
- Traitement : moulage fonctionnel, gingivectomie, détartrage,  
extraits placentaires, sans résultats. Grand bridge  
de contention supérieur en 1951, en Janvier 1953  
grosse amélioration.
- Pronostic médiocre.



Observation n° 5.

Madame Janine L..., née le 27 Mai 1915 - vue à 30 ans  
juin 1951 - début à 20 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : diphtérie, scarlatine, tétanos, typhoïde, scarlatine.
- Denture : caries, suppurations dentaires, légers empâtements.
- Radiographie : description verticale et horizontale normales.
- Traitement : antibiotiques, sulfamides, diversifs, traitement hormonal par substituts et hormones naturelles.
- Pronostic : favorable.

Observation n° 6.

Madame Janine L..., née le 21 Mars 1923 - vue le 14  
juin 1951 - début à 26 ans.

- Antécédents : diphtérie, scarlatine, cycle menstruel irrégulier, règles allongées, acrocyanose, lypothyrie, émotivité.
- Denture : caries, suppurations dentaires, lésions parodontales, occlusions normales.
- Radiographie : description horizontale réalisée l'immobilisation de la plupart des septa.
- Traitement : testostérone, stérhandry, cycladiène.
- Pronostic : bon.

Observation n° 11.

Mademoiselle Marie-Claude G..., née le 6 Janvier 1928 -  
vue à 24 ans le 8 Novembre 1952 - début à 16 ans par périnécrose  
rite de g8 et d8.

- Facteur familial : Père, Mère, Soeur.
- Antécédents : otite, var solitaire en 1938, scarlatine, tétanos en 1942, intolérance alimentaire, cycle menstruel irrégulier à la suite d'un épisode de toxémie, corps thyroïdien hypertrophié, frilosité, sueurs, engelures, tension artérielle basse, anxiété, morsure des joues, insomnie, otalgies, herpès.
- Denture : caries, suppurations dentaires, lésions parodontales, brosseage, Hypoplasie, accidents sur g8 - d8 - occlusions anormales, surcharge de D6 et d6.



- Radiographie : os propres, normaux, absorption horizontale, généralisée et verticale en D6.
- Pronostic : Bon.

#### Observation n° 16.

Mademoiselle Claire B..., née le 20 Juin 1905 - vue à 49 ans le 12 Décembre 1951 - début à 2 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : pleurésie, colite, arthrite, métrorragies, appendicectomie à 17 ans - signes hépatiques : intolérance alimentaire, ménopause, goître colloïde - sciatique, lumbago.
- Denture : tartre, gingivite à 25 ans, grosse édentation.
- Radiographie : atrophie horizontale, généralisée.

#### Observation n° 17.

Mademoiselle Paulette B..., née le 27 Août 1927 - vue à 25 ans le 28 Octobre 1952 - début à 24 ans.

- Facteur familial : père.
- Antécédents : diphtérie, colite, subictère, intolérance alimentaire, nervosité, néphrite, insomnie, agitation, crispations, bruxomanie.
- Denture : tartre, malocclusion légère sur les incisives inférieures, parodontite superficielle.
- Radiographie : alvéolyse généralisée, légère, à limite nette.

#### Observation n° 22.

Mademoiselle Marguerite G..., née le 11 Mai 1896 - vue à 54 ans le 4 Janvier 1950 - début à 22 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : broncho-pneumonie 1941 - ménopause 1950 - acrocyanose, sueurs, urticaire.
- Denture : tartre, gingivite, traitement orthodontique pendant 3 ans à l'âge de 10 ans. Édentée molaire infér. droite, mobilité dentaire et culs-de-sac suppurants.
- Radiographie : os propres, normaux, absorption horizontale floue, atrophie verticale.











#### Observation n° 44.

Mademoiselle Pierrrette R..., née en 1936 - vue à 14 ans le 7 Décembre 1950, début à 14 ans.

- Facteur racial : Méditerranéenne.
- Antécédents : rougeole, diabète (92 u. d'insuline par jour) hépatomégalie depuis 1946, régime diabétique.
- Denture : sertièvre gingivale rouge hypertrophique, légère supraclusion.
- Traitement : détartrage.

#### Observation n° 53.

Mademoiselle Hélène J..., née le 18 Octobre 1927, vue le 6 Juin 1951 à 24 ans, début à 20 ans.

- Facteur racial : Italienne.
- Facteur familial.
- Antécédents : appendicite, constipation, signes hépatiques, intolérance aux oeufs.
- Denture : tartre, carie, supraclusion avec surplomb, traumatisme occlusal, suppuration.
- Radiographie : atrophie mixte généralisée, bord flou.

#### Observation n° 54.

Mademoiselle M. D..., née le 28 Novembre 1924, vue le 20 Décembre 1948, début à 24 ans.

- Antécédents : ostéomyélite de 1932 à 1936, engelures, cycle normal (28 jours).
- Denture : tartre, occlusion irrégulière et traumatique, suppuration.
- Radiographie : os dense, atrophie mixte généralisée, bord net.
- Traitement : détartrage, moulage fonctionnel.
- Pronostic : médiocre.

#### Observation n° 55.

Madame V..., née en 1916, vue le 26 Juillet 1950, début à 20 ans.

- Antécédents : constipation, entérite, troubles des règles.



- Denture : carie, supraclusion, traumatisme occlusal, supuration.

- Radiographie : atrophie mixte généralisée.

- Prognostic : médiocre.

#### Observation n° 11

Monsieur Robert B..., né en Février 1925, vu à 27 ans le 25 Janvier 1951, début à 16 ans.

- Facteur racial : Grec.

- Facteur familial : Grand-père.

Antécédents : tabac, frilosité, nervosité, sommeil agité.

- Denture : tartre, gingivorragie au brossage, supraclusion, bémol molaire, avulsion des incisives inférieures.

- Radiographie : atrophie horizontale légère et 1/2 molaire dans la région incisive.

#### Observation n° 12

Monsieur Ernest B..., né le 13 Janvier 1921, vu à 27 ans le 15 Janvier 1948, début à 25 ans.

- Facteur racial : Piémontais.

- Antécédents : pharyngite en 1934, angine.

- Denture : tartre, suppuration et gingivite à 25 ans, mobilité et suppuration des incisives inférieures.

- Radiographie : supraclusion dominante de 1/2 molaire, verticale d7 d8 d1 g1 g2, atrophie mixte à prédominance verticale.

#### Observation n° 13

Monsieur Jean B..., né le 14 Décembre 1921, vu à 27 ans le 15 Janvier 1948, début à 16 ans, évolution de g8.

- Antécédents : tabac, subictère, sueurs, tics, urticaire dans l'enfance.



- Denture : caries, abrasions, accident de dent et saignement et occlusion en bout à bout, surcharge sur 41 et 42.
- Radiographie : résorption horizontale localisée antérieure.
- Traitement : extraction de 42 analysée suivie d'émolument mais complications inflammatoires ultérieures au niveau de l'extraction; 1 mois plus tard, l'état gingival semble normal.
- Pronostic : bon.

#### Observation n° 15.

Monsieur Maurice T..., né le 6 Janvier 1923, vu à 29 ans le 15 Avril 1952, début 20 ans (1902-3 p. 31 et 32).

- Antécédents : parasitose, scarlatine à 17 ans, anémie, astrophagie, tuberculose, élimination en très petites quantités. Néphrite après la scarlatine, suivie d'albuminurie, acrocyanose, nervosité, spasmes et nausées.
- Denture : suppuration au niveau des dents de 6 ans inférieures, surcharge occlusale en bout à bout au niveau de 66 d6.
- Radiographies os dense, atrophié, localisée nette, verticalement médio-vestibulaire avec hypertropie du menton de 41 d6 et ostéosclérose.

#### Observation n° 39.

Monsieur René V..., né le 8 Mars 1916, vu à 32 ans le 16 Octobre 1948, début à 22 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : rien à signaler.
- Denture : carie, abrasion, supraclusion et bécasse prévalent, mobilité des incisives.
- Radiographie : résorption alvéolaire localisée antérieures.
- Traitement : extraction 42, détartrage, nettoyage buccal.
- Pronostic : médiocre.

#### Observation n° 43.

Monsieur Oscar G..., né le 19 Mai 1905, vu à 47 ans le 5 Novembre 1952, début à 27 ans.



- Facteur racial : Italien.
- Facteur familial.
- Antécédents : gaz, colite, ictère à 8 ans, intolérance alimentaire, sueurs nocturnes, ongles striés minces.
- Denture : gingivite chronique localisée à D6, paruli sur D6, endognathie supérieure très importante, béances prémolaire bilatérale et incisive, craquement condylien à droite.
- Radiographie : résorption alvéolaire importante au niveau de D6.
- Traitement : meulage sélectif, vitamine E.

b) chez la femme.

Observation n° 3.

Mademoiselle Monique L..., née le 30 Novembre 1927, vue à 19 ans le 16 Juillet 1946, début à 18 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : eczéma chronique, signes végétatifs, asthénique.
- Denture : tartre, caries, lésions apicales sur d6.
- Radiographie : os dense, corticale nette, résorption horizontale généralisée légère et verticale en entonnoir.
- Traitement : gingivectomie simple, extraction des dérivés novocaïne périfaciale (sans effet), dilvosène semble donner une amélioration, extraits placentaires.

Observation n° 18.

Mademoiselle Gilberte C..., née le 1er Décembre 1923? vue à 25 ans le 12 Mai 1951, début à 24 ans.

- Facteur racial : Berry.
- Antécédents : érythème noueux vers 13 ans, constipation, digestions longues et difficiles, acrocyanose, frilosité.
- Denture : supraclusion légère, surcharge de D1 avec rhizalgie.
- Radiographie : atrophie générale horizontale légère.



Observation n° 21.

Mademoiselle Edda G..., née le 23 Septembre 1930,  
vue à 18 ans le 2 Octobre 1948, début à 16 ans.

- Facteur racial : Italienne.
- Facteur familial : Mère.
- Antécédents : appendicite, constipation, intolérance alimentaire, règles douloureuses mais régulières. Acrocyanose, syndrome de Reynaud, sueurs, engclures, rhumatisme cardiaque, sommeil tranquille vagotonique, Eczéma.
- Denture : tartre, gingivorragie au brossage et spontanée, accidents de dentition, migration et rotation à partir de 1948, mastication à gauche, accident de dent de sagesse G8, supraclusion sans surplomb, béance molaire, culs-de-sac suppurants.
- Traitement : détartrage, denture partielle, denture complète, nette au bloc incisif inférieur.
- Traitement : meulage des incisives inférieures, mise à plat des clapiers.

Observation n° 32.

Mademoiselle Simone S..., née le 22 Janvier 1931,  
vue à 18 ans le 2 Octobre 1948, début du diabète.

- Facteur racial : Russe.
- Antécédents : rougeole, diabète préputértaire depuis 1939, aménorrhée primitive, nanisme diabétique, acrocyanose, sueurs, congestion du visage, nervosité.
- Denture : tartre, salive peu abondante, occlusion normale, avec déviation vers la gauche, supraclusion avec surplomb, surcharge sur les incisives inférieures et supérieures.
- Traitement : détartrage, denture partielle, denture complète, horizontale généralisée, délimitation nette, atrophie verticale en cuvette sur d1 d2 D4.
- Traitement : détartrage, ligature, meulage fonctionnel incisive et canine dilvasène, nette amélioration.



5 - PARODONTOSE GENERALISEE

a) chez 1 homme.

Observation n° 12.

Monsieur Emile C..., né le 20 Janvier 1934, vu à 18 ans en Novembre 1952, début à 18 ans.

- Antécédents : acrocyanose.
- Denture : gingivorragie au brossage et gingivite, saignements gingivales, hyperplasiques et décollées. D3 inclinée, légère supraclusion incisive, surcharge des incisives inférieures et supérieures. Occlusion cuspidienne sur prémolaire et molaire à droite.
- Radiographie : atrophie horizontale légère généralisée, parodontose superficielle.
- Traitement : extraction de G6, laroscorbine forte.

Observation n° 20.

Monsieur Francis C..., né le 31 Août 1932, vu à 20 ans le 19 Novembre 1952, début à 18 ans.

- Antécédents : respire par la bouche, intolérance alimentaire, végétarisme, signe de Chvostek bilatéral.
- Denture : gingivorragie au brossage, gène spontanée, gingivite à 20 ans au cours des poussées d'évolution de la malposition sur D4 D3 D2 D1, G1 G2 G3 et d3 d2 d1, g1 g2 g3, surcharge sur G1 d1 g1 g2, endognathie et rétrognathie mandibulaire avec atrésie, béance incisive, caïn et précaïn à droite.
- Radiographie : atrophie horizontale localisée nette et verticale en G2, parodontose superficielle généralisée.

Observation n° 30.

Monsieur Pierre D..., né le 19 Août 1934, vu à 27 ans le 20 Juin 1951, début à 17 ans.

- Antécédents : entérite et dysenterie à 20 ans, nervosité, agitation.



- Denture : tartre, gingivorragie au brossage et au nettoyage, occlusion normale, parodontose localisée à 28 et 31 DC.
- Radiographie : os dense, atrophie horizontale localisée au vestibulaire et 28 et 31 DC.
- Traitement : détartrage, montage incisives inférieures, soins.

Observation n° 40.

Monsieur Jean-Pierre R..., né le 27 Novembre 1927, vu à 25 ans le 25 Janvier 1952, début à 22 ans, (photo p. 70).

- Facteur familial : Père.
- Antécédents : oreillons, varicelle, coqueluche, ischémie, subictère, intolérance alimentaire, nervosité.
- Denture : gingivorragie, ganglions sous-mandibulaires, hypersensibilité des collets, supraclusion en surplomb en bout à bout sur DI G1, dl g1.
- Radiographie : os dense, vertèbres net, atrophie horizontale généralisée nette.
- Traitement : hémostase gingivale, atropine, érythromycine, auto-vaccin, montage des incisives inférieures.

Observation n° 41.

Monsieur Roger R..., né le 17 Août 1926, vu à 25 ans en 1951, début à 19 ans.

- Antécédents : légère insuffisance hépatique, angine flegmeuse, striés, tabac.
- Denture : tartre, gingivorragie, agencement gingival, dent au gâteau de miel de Thomas, occlusion en bout à bout avec abrasion.
- Radiographie : os dense, atrophie horizontale généralisée.
- Traitement : montage sélectif, détartrage, extract plaques.

Observation n° 42.

Monsieur André P..., né le 19 Août 1925, vu à 26 ans le 17 Février 1951, début à 21 ans.

- Antécédents : tumeurs latentes à 14 ans, blennorrhagie et orchite unilatérale, onichophagie.



- Denture : tartre, salive abondante, gingivite en 1948 et suppuration en 1949, sur les canines inférieures et G7 muqueuse gingivale hypertrophiée surtout au bloc incisif inférieur.
- Radiographie : atrophie horizontale généralisée et verticale en entonnoir sur G7 d6 dl g1 g6.
- Traitement : extraits placentaires.

#### Observation n° 47.

Monsieur Paul M..., né le 5 Février 1924, vu à 27 ans en 1951, début à 18 ans.

- Facteur familial : Père et Mère.
- Antécédents : tabac, acrocyanose, sueurs, nervosisme.
- Denture : gingivorragie, abrasion, sègne incisive canine, lèvre améliforme.
- Radiographie : atrophie horizontale et verticale à bord irrégulier.
- Traitement : dilvasène.

#### Observation n° 50.

Monsieur Jacques B..., né en 1930, vu en 1954 à 24 ans, début à 21 ans.

- Antécédents : sténose du pylore, intolérance alimentaire, orchite à staphylocoques en 1951.
- Denture : tartre, gingivite, abrasions.
- Radiographie : atrophie horizontale généralisée à bord net, os dense parodontose superficielle.
- Pronostic : bon.

#### Observation n° 51.

Monsieur Jean-Pierre C..., né le 2 Avril 1925, vu le 22 Septembre 1951, début à 23 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : signe de Chvostek, nervosité, crampes, convulsions à 17 ans.
- Denture : tartre, supraclusion, traumatisme occlusal.
- Radiographie : atrophie horizontale généralisée et verticale.



sur D7 D7 du d7. parodontose superficielle.  
- Pronostic : bon.

Observation n° 52.

Monsieur Guy M..., né le 5 Octobre 1927 vu le 9  
Décembre 1952 à 25 ans, début à 24 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : constipation chronique, intolérance  
alimentaire, signe de Cheneau, rhumatisme articu-  
laire du genou en 1952.
- Denture : tartre, abrasion, lacunes cunéiformes, malposi-  
tions sur G6 g5, occlusion traumatique.
- Radiographie : atrophie horizontale généralisée et verticale  
légère sur d2, parodontose superficielle.
- Pronostic : bon.

et chez la femme.

Observation n° 9.

Madame F..., née le 4 Septembre 1914, vue à 36 ans,  
début à 26 ans.

- Antécédents : constipation, signes hépatiques, intolérance  
alimentaire, acrocyanose, rhumatismes, oedème de  
Quinck.
- Denture : caries, abrasions, lacunes cunéiformes, pas de  
mobilité dentaire.
- Radiographie : description horizontale et verticale - ce dernier  
limite nette.
- Pronostic : bon.

Observation n° 10.

Madame Rachel M..., née le 2 Janvier 1925, vue le  
23 Novembre 1950 à 27 ans, début à 22 ans.

- Facteur racial : Martiniquaise.
- Antécédents : signes gastriques, intolérance alimentaire,  
ménorrhagie, nervosisme.
- Denture : caries, abrasions, lacunes apicales sur D7.



- édentation molaire partielle, surcharge incisive.
- Radiographie : résorption horizontale et verticale généralisée irrégulière, os poreux.
- Traitement : détartage, soins de bouche, gingivite soignée.
- Pronostic : mauvais.

#### Observation n° 13.

Mademoiselle Edith C..., née le 11 Décembre 1927, vue à 31 ans le 17 Septembre 1952, début avant 25 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : subictère, régime hépatique, acrocyanose, frilosité.
- Denture : tartre, pas sur d6 g6, gingivorragie, gingivites antérieures, supraclusion, malpositions dentaires.
- Radiographie : résorption horizontale généralisée et verticale localisée à G6 d6.

#### Observation n° 15.

Madame SIMONE M..., née le 31 Mars 1918, vu à 31 ans le 12 Mars 1952, début à 20 ans.

- Antécédents : mastoïdite à 2 ans, intolérance alimentaire, gingivite avant les règles, acrocyanose, frilosité, nervosité, anxiété nocturne, urticaire.
- Denture : gingivorragie, gingivostomatites antérieures, édentation, surcharge sur d6 g6.
- Radiographie : os dense, corticale nette, atrophie horizontale généralisée peu marquée, atrophie verticale sur D6.
- Traitement : gingivectomie simple sur D6, bridges de remplacement.

#### Observation n° 18.

Mademoiselle Odette T..., née le 11 Mai 1925, vue à 27 ans le 8 Décembre 1952, début à 21 ans.

- Facteur racial : Normande.
- Antécédents : intolérance alimentaire, anxiété.



- Denture : tartre.
- Radiographie : atrophie généralisée avec prédominance sur les dents de 6 ans.
- Traitement : meulage sélectif.

#### Observation n° 46.

Mademoiselle Jacqueline P..., née le 29 Mars 1929, vue à 22 ans le 3 Octobre 1951.

- Facteur racial : Est.
- Antécédents : eczémas, surdes au sein, tumeurs appendiculaires, hernie ombilicale opérée, intoxication alcoolique, règles peu abondantes, cycle irrégulier, surmenage, se, frilosité, sueurs, rhumatismes, nervosité.
- Denture : gingivorragie spontanée et au brossage, caries, abrasion, supraclusion sans surcroûte, lésions mineures dans la proglutination, blanchissement post-étiot.
- Traitement : extraction de g8, détartrage, meulage fonctionnel, acide, dilvasène.

#### PARODONTOSE LOCALISEE.

a) chez l'homme.

#### Observation n° 57.

Monsieur Paul P..., né en 1928, vu en Mars 1953, début à 24 ans.

- Antécédents : rien à signaler.
- Denture : abrasions.
- Radiographie : parodontose localisée.

b) chez la femme.

#### Observation n° 58.

Mademoiselle Huguette R..., née le 11 Octobre 1932, vue le 2 Février 1953, début à 20 ans.

- Antécédents : acrophagie, appendicite chronique, stig. d. Crohn, cycle menstruel allongé, osseux fragiles.



- cheveux cassants, eczéma au nylon.
- Denture : abrasion supraclusion, rétrognathie mandibulaire.
- Radiographie : parodontose localisée.



## CONCLUSION

Nous allons pouvoir tirer de cette revue générale et des observations que nous avons brièvement résumées des conclusions d'ordre nosologique, étiologique, clinique, thérapeutique et prophylactique.

### 1°) NOSOLOGIE

Nous avons pu constater que chez le jeune les gingivites et gingivoses d'une part, et les parodontolyses d'autre part, reentraient dans le cadre des maladies générales et venaient en compléter le tableau clinique. Nous avons noté tout particulièrement que les facteurs de l'équilibre physiologique au niveau des parodontes sont les mêmes qu'au niveau des "extrémités".

### 2°) ETIOLOGIE

Quel que soit l'aspect clinique des parodontolyses, l'étiologie est complexe. Il nous semble que l'on peut classer ces facteurs étiologiques en facteurs dominants, secondaires et déterminants.

#### a) Facteurs dominants :

Le facteur constitutionnel semble jouer chez un individu donné un terrain particulier sur lequel pourra se développer une parodontolyse à la faveur d'un trouble général dans la grande majorité des cas, et quelquefois à la faveur d'un trouble local. Ce facteur constitutionnel est déterminé par l'hérédité, la race, et le milieu dans lequel vit cet individu.

#### b) Facteurs secondaires :

Les désordres généraux notés au cours des observations sont variés. Au premier lieu se placent les troubles hémo-



gastro-intestinaux, le déséquilibre neuro-vasculaire se traduisant par un neurocisme particulier, avec tendance à l'angor, aux crispations, par l'hypertension, le signe de Shvartz, une fragilité des os, enfin, les troubles convulsifs et plus spécialement l'hypo-thyroïdisme et l'hyper-tension.

## c) Facteurs déterminants :

Ce sont les facteurs locaux qui déterminent l'aspect et la localisation de la parodontolyse. Ces facteurs, chez le jeune avant 25 ans sont dominés par l'évolution de la dent de sagesse et les troubles de l'occlusion, et singulièrement par la supraclusion; enfin, toutes les causes d'irritation, tartres, caries, mortifications pulpaire, lésions apicales, entretenues soit par voie réflexe, soit par propagation infectieuse, des inflammations chroniques.

## 3-1) CLINIQUES

L'étude de 57 observations de parodontolyse ayant débuté avant 25 ans nous a permis d'observer des formes inflammatoires, parodontites généralisées ou localisées, des formes dystrophiques, parodontoses généralisées et localisées. Ces formes, chez ces sujets prédominent sur le côté incisif et les premières molaires.

## 3-2) THERAPEUTIQUE.

La thérapeutique aura pour but essentiel de corriger les troubles généraux et locaux qu'un examen rigoureux et complet aura mis en évidence.

a) Le traitement local est symptomatique. Il supprimera toutes les causes d'irritation mécanique et infectieuse et rétablira prothétiquement ou par ajustement mécanique de l'articulé équilibré et par suite la fonction. Ce traitement, inséparable d'une hygiène rigoureuse, a pour but d'éviter les complications locale, régionales et à distance.

b) Le traitement général médical pur, sera une thérapeutique de fond visant à supprimer la ou les déviations pathologiques générales qui déterminent la parodontolyse.







M.B. and Others - 1939 - Tuberculosis osteomyelitis of mandible with the tuberculous infection of the oral  
Am J. Orthodont. 25 - 475.

CHAPUT, J. FURET - Signes buccaux des leucoses  
de l'enfant.

1953 - The apparent antagonism between  
periodontal disease - J. of Periodontology 2

Endocrinologie et parodontose  
1954 - 1 - 2

Etiologie et traitement des parodontolyses.

J.C. - 1943 - Systemic and local factors in periodontal  
problem - J.A.D.A. 30 - 45.

1944 - Journal of dental Research 22 - 309.

1946 - Oral disease in children - J. New Jersey State -  
D.Jor. 17-18 - 1946.

ARMAT B.O. - 1944 - Congenital macrogingivae and  
oral surgery 15 - 964 - 4.

J. - Les manifestations buccales de la maladie  
Siwe - Thèse Paris 1952 - 83 j. Niblis.

G., VIGNONO - 1950 - Sur un cas de paraden  
cocc - Minerva Medica - 1-28-981.

CHUT A. - 1951 - Manifestations buccales du diabète  
Revue Odontologique 5 - 285 (voir UERY).

JULIEN A., GABILLIET - 1953 - Parodontopathies  
Rapport du Congrès de A.R.P.A. à Genève - Juillet



- CHARTERS W. - 1930 - Tuberculose mandibulaire - Rev. Odont. ....
- CHARTERS W. - 1948 - Homecare of the mouth proper - J. Period. ....
- CHARTERS W. - 1950 - Some Public Health aspects of ...  
Dysphagia J.A.D.A. 40 - 28.
- CHARTERS W. - 1947 - Dental care of children under five years  
Dent. record 67 - 236.
- CHARTERS W. - 1947 - In periodontal disease ...  
Dent. record 67 - 236.
- CHARTERS W. - 1939 - Keratosis palmaris and plantaris with dent  
... - Dermat. and Syphil. - 4 - 139.
- CHARTERS W. - 1935 - Xanthomasis - Schüller-Christian's Disease  
J. Missouri - M/A. 32 - 466.
- CHARTERS W., et Coll. - 1932 - Aerodynie infantile à forme mutilante  
Bull. Soc. Pediat. 5 - 314 à 321.
- CHARTERS W., Melle PETOT - 1924 - Syndrome de Morvan et troubles  
veux divers chez un enfant de 4 ans - Sté de Pedi  
10 - p. 381.
- DECHAUME M. - 1949 - Précis de Stomatologie - ...
- DECHAUME M., CHAPUT, HELD A.J. - 1949 - Granulome histiocytic  
... - Revue de Stomatologie ...
- DECHAUME M., DECHAUME M. - 1941 - Primo infection t  
gencive - Bull. Soc. Fran. Dermatologie - ...
- DECHAUME M. - 1933 - la pyorrhée dans le cadre général des  
tions tissulaires.  
Odontologie - Avril 1935 - 71 n° 4.
- DECHAUME M. - 1952 - Periodontia prevention - The  
Magazine - n° 8 Mai p. 9 à 12.
- DECHAUME M. - 1949 - Abnormal colour change in the  
Surg. O. Med. a, d, O. Path. 2 - 649.
- DECHAUME M., DECHAUME M. - 1951 - La dentition dans les ...  
... - Sté de Stomatologie et  
de Radiographie - 13 Mars - avec photos.



1. BAIN K. - 1945 - Dental care for children -  
dentaires - 4-1.

2. - 1947 - Pericoronitis and parodontitis  
1947 - 1948.

3. (Mme) - 1952 - Manifestations buccales de la leucose aigüe  
chez l'enfant - Thèse, Paris dact. 66 p. Bibliogr.

4. DUN C.M. - 1941 - Part Time Mouth breathing and periodontoc  
J. Period - 12 - 1.

5. OUEC-LAMBERT, BUHOT-VIGNEUL, CASTEL - 1953 - A propos de  
l'observation de réticulose histiocytaire maligne ou  
die de Letterer-Siwe - Revue de Stom. 54-1-40.

6. - 1949 - Standards of dental care for different  
groups - Am. J. Publ. Health - 39-979.

7. A. - 1937 - Contribution à l'étude de l'acrodyne  
Thèse Paris, Amédée Legrand Edit. 167 p.

8. - 1947 - The role of the  
tor in the production of malocclusion - J. Dent

9. ID A.J., RUTISHAUSER E. - 1948 - L'Histiocyto-réticulose de  
granulomatose eosinophile des maxillaires - Bul.  
Suisse Sud. 414.

10. - 1947 - The role of the  
Archiv. für dermato

11. - 1947 - Parodontosis en la infancia - Revista Odont.

12. - 1950 - A cytologic study of the corn  
oral cancer in women. O. Stom. 51-1-1516 - 1520 - 3 fig. Bibl.

13. M R., MAININI C.G. - 1948 - Un nuevo caso de paradento  
infancia. Revista Odont. 36 - 323.

14. - 1950 - Les lésions  
observés au Tonkin - Rev. de Stom.

15. L O.P. - 1939 - The Treatment of  
hydantoinate - J.A.M.A. 112 - 112.











- SIEGMUND H. - 1951 - Le parodonte dans l'endarterite oblitérante généralisée - Parodontologie - 5-2-57.
- SIEGMUND H. - 1949 - Du facteur nerveux dans la pathogénie des affections paradentaires - Médecine et hygiène 159-399.
- STAZ J. - 1952 - Report on recent advances in the prevention of periodontal disease - J1 Dent Int. 3p. 345-371-139 ref.
- THOMA K.H. - 1951 - Gingival hypertrophie and hypertrichosis-Oral Pathology - p. 173.
- THOMAS B. O.A. - 1947 - The child patient as a futur periodontal problem - J1 D.A. n° 11 1947 - p. 764.
- UHRYP., CHAPUT A., DUCAS P., ELIACHAR S. - 1952 - les lésions dentaires des jeunes diabétiques - Semaine des Hôpitaux de Paris 28:1pl à 11 bibl.
- WOOD E.C., WALLACE J., SAND D.M. - A case of alveolar atrophy of unknown origin in a child - Am J1 Ortho and oral surg 27-12p 676-682.
- WARKANY, HUBBARD - 1951 - Adverse mercurial reactions in the form of acrodynia and related conditions - J1 Dis. of children - 81-335.
- WATKIS C.J. - 1952 - Periodontal lesion in children - N.Y. University J1 Dentistry 4-190.
- WESKI - 1920 - Elephantiasis finfiore heredireria - Deut. Mond. Zahn n° 557.
- WICKHAM N.E. - 1952 - Gingival and periodontal lesions in children - The nex Zealand dental journ 4-132 - 17 Ref. bibl.
- ZAPPLER E. - 1948 - Periodontal disease in children - J.A.D.A. 3 p. 333 à 345 - 29 ref.
- ZISKIN D.E. - 1938 - Effects of certain hormones on gingival and mucous membranes J. Am Dent A. 25 - 422.
- ZISKIN D., KAMEN F. - 1941 - Epithelial smears of the oral mucosa J Dent. Reasearch 20 - 386.
- ZISKIN D.E., MOULTON R. - 1948 - A comparison of oral and vaginal smears J. Dent Res. 8:146.





